

ทำอย่างไรเมื่อ...

ถูกสัตว์กัด ช่วน

1.ล้างแผล

โดยเปิดน้ำไหลผ่านแผล และ ฟอกสบู่
หลายๆครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที



2.ใส่ยา

เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่
ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน



3.กักหมา

เพื่อสังเกตอาการ
10 วัน



4.หาหมอ

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน
ตามกำหนด



หยุดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยหลัก 5ย.



1.อย่าแหย่
ให้สัตว์โมโห



2.อย่าเหยียบ
หาง หวี ขา
หรือให้สัตว์ตกใจ



3.อย่าแยก
สัตว์ที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



4.อย่าหยิบ

ชามอาหาร , ของเล่น
ขณะที่สัตว์กำลังกินหรือเล่น



5.อย่ายุ่ง

กับสุนัขแม่ลูกอ่อน
ในขณะที่แม่อยู่ด้วยกับลูก



" สุนัข / แมวกัดต้อง
ล้างแผล ใส่ยา กักหมา
หาหมอฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด
และอย่าลืมฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงทุกปี "



LIKE US ON FACEBOOK
www.facebook.com/SoiDogPageInEnglish



FOLLOW US ON TWITTER
www.twitter.com/@SoiDogPhuket



FOR ADDITIONAL INFORMATION
www.soidog.org

วิธีป้องกันการระบาด โรคพิษสุนัขบ้า

การฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการ
ฉีดวัคซีนประจำปี


ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการฉีดวัคซีน
ให้กับสัตว์ในชุมชนอย่างน้อย 80% จะช่วย
ทำให้ชุมชนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

ควรฉีดวัคซีนสุนัขหรือแมวทันที
หลังการรับเลี้ยงและกระตุ้นทุกปี
เพื่อลดความเสี่ยงของโรคและช่วย
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



การทำหมัน

ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวของ
สัตว์และทำให้สัตว์อยู่ติดบ้านยิ่งขึ้น
รวมทั้งทำให้โอกาสในการรับ
เชื้อพิษสุนัขบ๋าน้อยลง



มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)